แนวทางการปฏิบัติการใช้ PREW Score, monitor q 4 hrs

0

- ไม่เร่งด่วน
- ให้การดูแลตามปกติ

1 – 3 (Low Risk)

- ประเมินซ้ำ พร้อมจัดการอาการเบื้องต้นตาม ABCDEF model
- Record PREW score **q 4 hrs**

4 – 5 หรือ Parameter ตัวใดตัวหนึ่ง = 2 (Moderate risk)

- ประเมินซ้ำ พร้อมจัดการอาการเบื้องต้นตาม ABCDEF model
- รายงาน intern, staff และได้รับการจัดการ***ภายใน 30 นาที***
- ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
- Record PREW score **q 2 hrs x 2 ครั้ง**

PREW score 4-5

PREW score ≥ 6

≥ 6 หรือ Parameter ตัวใดตัวหนึ่ง = 3 หรือ มีอาการแสดงที่ผิดปกติ (High risk)

- ประเมินซ้ำ พร้อมจัดการอาการเบื้องต้นตาม ABCDEF model
- เตรียม emergency cart/defibrillator (Monitor SpO2)
- รายงาน intern, staff ทันที และได้รับการจัดการ***ภายใน 15 นาที***
- ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

อาการแสดงที่ผิดปกติ

- ซีด เขียว ตัวลาย
- หยุดหายใจ หายใจเฮือก
- กระสับกระส่าย
- ใจสั่น แน่นหน้าอก
- ซึม ชัก
- Active bleeding
- อาการแพ้เฉียบพลัน

กลุ่มกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลปัตตานี
18 กุมภาพันธ์ 2565