ชื่อ-สกุล HN/AN

DOCTOR ORDER SHEET FOR SEVERE SEPSIS / SEPTIC SHOCK

□ Walk in □ Refer จาก รพ. ..... □ Case Ward..... □ U/D.....

SIRS: □ BT >38° C or< 36° C □ PR >90 /min □ RR > 20 / min □ WBC > 12,000 Cell /mm 3 or 10%

M-SOS- score .....คะแนน/ **SOS score** .....คะแนน **NEWS**.....คะแนน

Severity: □ Sepsis □ Severe Sepsis (Sepsis with organ failure) □ Septic shock

Diagnosis.....วันที่ Diag.....เวลา.....**น.**

Source infection: □ Respiratory tract □ Gastrointestinal tract □ Genitourinary tract □ CNS □ Skin &Soft tissue .....

ชนิดของการติดเชื้อ □ Community □ Nosocomial

DATE/ TIME	ORDER FOR ONE DAY	DATE/ TIME	ORDER FOR Continuous
.../..../... .....น.	☐ Admit ICU กรณี Severe sepsis/Septic shockเวลา.....น. ☐ Admit ward.....เนื่องจาก..... - Lab: CBC, BUN, Cr, Electrolyte, HCO3, LFT, PT, PTT, INR , Serum lactate DTX stat .....mg % ☐ อื่น ๆ..... O2..... / ET tube No….. Depth…....cms. EKG 12 leads, CxR.....		☐ NPO ☐ Retain NG ☐ Diet..... Record V/S ตาม Protocol Record I/O as ml
		..... น.	DTX q.....hr. Keep 80 – 180 mg%
		..... น.	M-SOS SOS score q..... hr.
		..... น.	
		..... น.	2.ATB *ให้ภายใน 1 hr. หลังวินิจฉัย ☐ Ceftriaxone 2 g IV OD with stat ☐ Ceftazidime 2 g IV q.....hr. with stat ☐..... ☐.....
		..... น.	
..... น.	1.H/C x 2specimen *ก่อน start Antibiotic ☐ G/S จาก..... ☐ C/S จาก.....☐ UA **กรณี Severe Sepsis ที่ Lactate ≥4 mmol/L หรือ Septic shock 3. Load IV fluid*อย่างน้อย 30 ml/kg ใน 1 ชั่วโมงแรก ☐ LRS / ☐ NSS/☐Acetar .....ml IV drip		การรักษาเพิ่มเติม ....
..... น.	in.....Total…...ml then.....rate.....ml/hr. 4.Drip vasopressor* keep MAP ≥ 65 mmHg		....
..... น.	☐ Levophed (1:50) 2 mg + 5% D/W up to 100 ml IV drip.....ml/ hr titrate ครั้งละ 5 ml/hr. 10 min		.....
..... น.	☐ Levophed (1:25) 4 mg + 5% D/W up to 100 ml IV drip..... ml/hr titrateครั้งละ 3 ml/hr. 10 min ☐ Dopamine (2:1)200 mg + 5% D/W up to 100 ml IV drip.....ml/hr. titrateครั้งละ 5 ml/hr. 10 min		ยาเดิมผู้ป่วย ☐..... ☐..... ☐..... ☐..... ☐..... ☐.....
	5. Retain Foley cath., Keep urine output ≥ .....ml/.....hr (> 0.5 ml/kg/hr.) (ทิ้งปัสสาวะที่ค้างใน bladder.....ml) 6. If lactate ≥2mmol/L repeatอีก 6 hr. การรักษาเพิ่มเติม .... ลงชื่อแพทย์.....		ลงชื่อแพทย์..... ปรับปรุง เม.ย..67 PCT อายุรกรรม รพ.ปัตตานี