ชื่อ-สกุล HN/AN

Nosocomial Sepsis

DOCTOR ORDER SHEET FOR SEPSIS /SEVERE SEPSIS / SEPTIC SHOCK

SIRS: □ BT >38° C or< 36° C □ PR >90 /min □ RR > 20 / min □ WBC > 12,000 Cell /mm 3 or 10%

M-SOS- score .....คะแนน/ **SOS score** .....คะแนน **NEWS**.....คะแนน

Severity: □ Sepsis □ Severe Sepsis (Sepsis with organ failure) □ Septic shock

Diagnosis.....วันที่ Diag.....เวลา.....**น.**

Source infection: □ Respiratory tract □ Gastrointestinal tract □ Genitourinary tract □ CNS □ Skin &Soft tissue .....

DATE/ TIME	ORDER FOR ONE DAY	DATE/ TIME	ORDER FOR Continuous
.../..../...	*Simple Sepsis* ข้อ 1,2	..... น.	2.□ ATB *ให้ภายใน 1 hr. หลังวินิจฉัย
.....น.	1.□ H/C x 2specimen *ก่อน start Antibiotic		□ Meropenem .....
	□ G/S จาก..... □ C/S จาก.....		.....
	□ UA □ CxR.....		.....
	Severe Sepsis / Septic Shock ข้อ 1- 6	..... น.	□Tazocin.....
..... น	3.□ Load IV fluid*อย่างน้อย 30 ml/kg ใน 1 ชั่วโมงแรก		.....
	□ LRS / □ NSS/□Acetar .....ml IV drip		.....
	in.....Total.....ml		□Sulcef .....
	then.....rate.....ml/hr.		.....
..... น.	4.□ Drip vasopressor* keep MAP ≥ 65 mmHg	..... น.	□.....
	□ Levophed (1:50) 2 mg + 5% D/W up to 100 ml IV	..... น.	.....
	drip.....ml/ hr titrate ครั้งละ 5 ml/hr. 10 min		.....
	□ Levophed (1:25) 4 mg + 5% D/W up to 100 ml IV		.....
	drip..... ml/hr titrateครั้งละ 3 ml/hr. 10 min		.....
	□ Dopamine (2:1)200 mg + 5% D/W up to 100 ml IV		.....
	drip.....ml/hr. titrateครั้งละ 5 ml/hr. 10 min		.....
	5.□ RetainFoleys cath.: *Keep urine output ≥ 0.5 ml/kg/hr		.....
	(ทิ้งปัสสาวะที่ค้างใน bladder.....ml)		.....
..... น.	6.□ serum lactate stat (If lactate ≥ 18mg/dl ให้repeat) การ		.....
	<u>รักษาเพิ่มเติม</u>		.....
	.....		.....
	.....		.....
	.....		.....
	.....		.....
	.....		.....
	.....		.....
	ลงชื่อแพทย์.....		ลงชื่อแพทย์.....
	ปรับปรุง เม.ย.66 PCT อายุรกรรม รพ.ปัตตานี		